

ABSTRAK

Nama : Nabila Wahyu Salsabilla
Program Studi : Kedokteran umum
Judul : Hubungan Infeksi Saluran Kemih Terhadap Anak *Stunting* dan *Non-stunting* Usia 24-72 Bulan di Pandeglang dan Tinjauannya Menurut Pandangan Islam.

Latar Belakang: *Stunting* adalah status gizi yang didasarkan pada Indeks Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) dibandingkan dengan standar baku WHO, nilai Zscorenya kurang dari -2SD dan dikategorikan sangat pendek jika nilai Zscorenya kurang dari -3SD. Prevalensi *Stunting* di Provinsi Banten merupakan salah satu provinsi yang memiliki peran pada tingginya prevalensi *stunting* di Indonesia. Faktor langsung seperti rendahnya asupan gizi dan penyakit infeksi yang salah satunya infeksi saluran kemih adalah faktor penyebabnya terjadi *stuning*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada tidaknya hubungan Infeksi Saluran Kemih terhadap anak *Stunting* dan *Non-stunting* usia 24-72 bulan di Pandenglang Banten dalam tinjauan islam.

Metode: Jenis Penelitian yang digunakan adalah survey dengan rancangan penelitian *cross sectional* dan menggunakan total sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah anak usia 24-72 bulan pada pemberian telur Universitas Yarsi di Desa Kadugadung dan Puskesmas Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Hasil: Penelitian ini ditemukan bahwa 43 balita *stunting* (59,0%) yang mengalami ISK (8 15.1%) dan 30 balita tidak *stunting* (41,0%) yang terjadi ISK pada balita 3 (4%). Berdasarkan hasil uji *Chi Square test* tidak terdapat hubungan yang signifikan antara infeksi saluran kemih terhadap anak *stunting* dan-non *stunting* (*p-value* 0,525) di Pandeglang.

Kesimpulan: Pentingnya bagi orang tua dan balita untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta asupan gizi yang dapat mencegah tubuh dari berbagai infeksi dan gagal pertumbuhan. Dengan memberi asupan gizi yang baik dan menjaga kebersihan diri maupun lingkungan, tubuh akan terhindar dari penyakit sehingga memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah dan menjaga keturunan yang baik dan sehat.

Kata Kunci: Infeksi Saluran kemih, sanitasi lingkungan, gizi, usia anak 24-72 bulan, *Stunting*

ABSTRACT

Name : Nabila Wahyu Salsabilla
Study Program : Medicine
Tittle : The Correlation Of Urinary Tract Infection Instunting And Non-Stunting Children Aged 24-72 Months In Pandeglang, Banten And Their Review According To Islamic View.

Background: stunting is a nutrition status based on the age-long index (PB/U) or age-height (TB/U) compared with who's default, the zscore is less than -2 SD and is categorized very short if the zscore is less than -3 SD. The existence of stunting in the banten province is one of the most comprehensive provinces in Indonesia. A direct factor such as poor nutrition intake and infections in which one of the urinary tract infections is the cause of stuning. The purpose of this study is to know if there is any connection between urinary tract infections in stunting and non-stunting age 24-72 in Pandenglang Banten in islamic review.

Method: the type of research used was a survey with a sectional cross research design and used total sampling. Samples in this study are 24-72 month old children on the eggs of yarsi university in the village of Kadugadung and Public health in Labuan of Pandeglang, Banten.

Results: this study found that 43 stunting toddlers (59.0%) who became isk (8.15.1%) and 30 children not stunting (41,0%) were what happened to isk children 3 (4%). According to the chi square test, there is no significant connection between urinary tract infections to stunting and non-stunted stunted children (p-value 0.525) in Pandeglang.

Conclusion: it is important for parents and toddlers to keep clean of themselves and the environment and nourishment that can prevent the body from various infections and growth. By putting in good nutrition and by being clean of both self and environment, the body will avoid illness and will thus make it easier for us to practice worship and for good and healthy offspring.

Keywords: Urinary Tract, Environmental Agitation, Nutrition, Child Age 24-72 Months, Stunting.