

**GAMBARAN PENGGUNAAN OBAT ANTIDEPRESSANT TERHADAP
PENDERITA GANGGUAN DEPRESI DI RUMAH SAKIT JIWA
DR. SOEHARTO HEERDJAN PERIODE JANUARI – JUNI
2017 DAN TINJAUANNYA MENURUT AGAMA ISLAM**

Suryantio Jiwandono¹. Nasruddin Noor². Arsyad³

ABSTRAK

Latar Belakang : Depresi termasuk dalam gangguan mental yang paling sering ditemukan. Menurut konsensus ahli depresi dapat diterapi menggunakan obat antidepresan. Dalam penggunaannya, obat antidepresan dilihat memiliki banyak memiliki efek samping yang diberikan terhadap pasien.

Metode : Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk melihat obat-obatan antidepresan yang digunakan sebagai terapi pada pasien gangguan depresi mayor di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif.

Hasil : Hasil dituliskan dalam bentuk tabel, dengan data yang didapatkan adalah data persebaran distribusi pasien gangguan depresi mayor berdasarkan jenis kelamin, usia, klasifikasi gangguan depresi mayor, varian golongan antidepresan, dan penggunaan obat tambahan selain antidepresan.

Kesimpulan : Didapatkan bahwa penggunaan obat antidepresan terbanyak merupakan obat antidepresan dari golongan *Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI)*. Dengan jenis terapi polifarmasi.

Kata Kunci : Antidepresan, Gangguan Depresi Mayor

¹Mahasiswa, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

²Dosen, Departemen Ilmu Kesehatan Jiwa, Fakultas Kedokteran Universitas YARSI

³Dosen, Departemen Ilmu Agama Islam, Universitas YARSI

***USAGE OF ANTIDEPRESSANT ON PATIENTS WITH DEPRESSIVE
DISORDER IN DR. SOEHARTO HEERDJAN'S MENTAL HEALTH
HOSPITAL JANUARY - JUNE 2017 PERIOD AND THE REVIEW
FROM ISLAM PERSPECTIVE***

Suryantio Jiwandono¹. Nasruddin Noor². Arsyad³

ABSTRACT

Background: Depression is amongst the most common mental disorder. From the expert's consensus, depression can be treated by antidepressant. In the treatment, antidepressant keen to have a lot of side effect for the patient

Metodes: this study used quantitative descriptive methods to see the variants of antidepressant in treatment for patient with major depressive disorder in Mental Health Hospital Dr. Soeharto Heerdjan. Data used were retrospectively picked.

Results: The results are written in a form of table, with data of distribution of patients with major depressive disorder seen from gender, age, classification of major depressive disorder, variants of antidepressant, and usage of additional medicine beside antidepressant.

Conclusion: The usage of antidepressant in treatment was a variant from Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRI) group. With a polypharmacy treatment.

Keyword: Antidepressant, Major Depressive Disorder

¹Student, Faculty of Medicine YARSI University

²Lecturer, Departement of Psychiatry Faculty of Medicine YARSI University

³Lecturer, Department of Islam, YARSI University